

SKIEPAI NUO KOKLIUŠO

Kūdikiams:

- DTaP-IPV-Hib - 2, 4, 6 mėn. (nemokamai)

Vaikams:

- DTaP-IPV-Hib - 18 mėn. (nemokamai)
- DTaP-IPV - 6-7 m. (nemokamai)

Paaugliams:

- Tdap - 15-16 m. (nemokamai)

Suaugusiems:

- Tdap - vieną kartą gyvenime suaugus (mokamai)

Nėščiosioms:

- Tdap - kiekvieno nėštumo metu, 27-36 sav. nėštumo savaitę (nemokamai)

PREVENCIJA



- Skiepijimas kokliušo vakcina
- Dažnas rankų plovimas
- Kokliušo simptomų žinojimas
- Artimo sąlyčio su kūdikiais vengimas
- Atsiradus simptomams:
- Kaukės dėvėjimas
- Kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl gydymo



KOKLIUŠO PROFILAKTIKA

SIMPTOMAI

Inkubacinis laikas dažniausiai trunka 7 – 10 dienų, tačiau gali svyruoti 4 – 21 dienas.

- „Lojantis“, spazminis kosulys;
- Čiaudulys
- Sloga
- Temperatūra
- Ašarojančios akys
- Kosulys gali trukti 1 – 10 savaičių



KOKLIUŠAS

Kokliušas, tai ūmi kvėpavimo takų liga, kurią sukelia bakterija *Bordetella pertussis*. Sukėlėjas išskiria toksinus, kurie pažeidžia gleivinę ir sukelia uždegimą. Kokliušas ypač pavojingas kūdikiams ir vaikams iki 5 m. amžiaus.

